

ESPECIE

DESCRIPCIÓN



NATIVO

Rango altitudinal: 2500 - 4000 ms.n.m.

Endemismo: endémica.

Distribución: Colombia.

Categoría de amenaza: LC

Ecosistema: bosque andino y páramo.

El macho adulto es principalmente de color café rojizo brillante con la cabeza y cuello negros, las mejillas blancas y el pico azul. En plumaje no reproductivo de ambos sexos, son de café grisáceo por encima, con los lados de la cabeza de color blanco y sus partes inferiores de color negruzco. Habita en lagos y cuerpos de agua dulce con vegetación emergente.



NATIVO

Rango altitudinal: 0 - 3000 ms.n.m.

Endemismo: cosmopolita.

Distribución: desde el sur de Estados Unidos (Florida) hasta Brasil y el norte de Argentina.

Ecosistema: bosque húmedo-bosque andino.

Puede medir hasta 20 metros de altura. Los frutos son bayas pequeñas y al igual que las flores están dispuestos en grupos; sus ramas son largas, delgadas y flexibles; Los frutos maduros adquieren un color negro y sirve de alimento a las aves. El cucharero crece tanto en zonas de baja altitud en bosques subandinos hasta en las zonas cercanas a los páramos.

ESPECIE

DESCRIPCIÓN



Cucarachero de Apolinar
Catantopus apolinari

NATIVO

Rango altitudinal: 1800 - 4000 ms.n.m.
Endemismo: endémica.
Distribución: Colombia.
Categoría de amenaza: EN
Ecosistema: bosque húmedo bosque andino y páramo.
El Cucarachero de Apolinar mide alrededor de 13 cm, tiene la coronilla café oliva y una franja grisácea sobre los ojos; las alas y el vientre tienen pintas negras. Se encuentra en las orillas de lagos y lagunas y se alimenta de insectos acuáticos que encuentra en la vegetación.



Roble
Quercus humboldtii

NATIVO

Rango altitudinal: 1400 - 3300 ms.n.m.
Endemismo: casi endémica.
Distribución: Colombia y Panamá.
Ecosistema: bosque húmedo y bosque andino.
Es un árbol que crece hasta 25 m de altura, su corteza es gris con fisuras en escamas, las flores son pequeñas, amarillas y unisexuales con disposición en racimo y el fruto es de color castaño claro con forma de bellota. Permite la ubicación de plantas epifitas, las flores son visitadas por abejas y las bellotas son consumidas por el venado, la ardilla, el borugo, entre otros.

ESPECIE

DESCRIPCIÓN



Sangregado
Crotalaria draco

NATIVO

Rango altitudinal: 0 - 1400 ms.n.m.
Endemismo: cosmopolita.
Distribución: México hasta el Amazonas.
Categoría de amenaza: LC
Ecosistema: bosque húmedo.
Alcanza hasta 20 m de alto; las hojas son de color verde brillante y el envés grisáceo con olor picante o desagradable; en el sitio donde se insertan las hojas a la rama, se encuentran glándulas en forma de puntos anaranjados. Tiene látex rojizo en la corteza y se considera que tiene propiedades medicinales.



Rubio
Salminus alpinus

NATIVO

Rango altitudinal: 0 - 800 ms.n.m.
Endemismo: casi endémica.
Distribución: se encuentran en Sudamérica, cuencas de los ríos Magdalena y Santiago en Ecuador.
Ecosistema: bosque seco y bosque húmedo.
Los machos alcanzan los 100 cm de longitud; el cuerpo es alargado, la parte dorsal es gris plata y la parte ventral blanco-amarillento; la parte inferior de la cabeza es dorada, la aleta de color negro y rosado intenso hacia las puntas. Vive en zonas de clima tropical, las bellotas son consumidas por el venado, la ardilla, el borugo, entre otros. "la sublienda".

ESPECIE

DESCRIPCIÓN



Buchón
Limnoblum laevigatum

INVASORA

Rango altitudinal: 130 - 2800 ms.n.m.
Distribución: nativa de África, introducida en Colombia.
Ecosistema: bosque seco, húmedo y andino. Crecen en rosetas de hojas flotantes que se postran sobre la superficie del agua, las plantas maduras crecen hasta 50 cm de altura, las flores son pequeñas, blancas y unisexuales, la fruta es una cápsula carnosa. Planta de rápida propagación; puede reproducirse y distribuirse sexualmente y también vegetativamente a través de la fragmentación de segmentos de estolón.



Acacia gris
Acacia decurrens

INVASORA

Rango altitudinal: 1000 - 3000 ms.n.m.
Distribución: nativa de Australia, introducida en Colombia.
Ecosistema: bosque seco, húmedo y andino. Planta que alcanza una altura de 8-10 m, con las ramas finamente aterciopeladas. Hojas adultas ramificadas, brillantes, separadas, abiertas y planas durante el día, replegadas y cerradas por la noche; flores pequeñas de color amarillo vivo. Crece rápidamente en ambientes naturales, convirtiéndose en un problema para las especies nativas, desplazándolas de sus ecosistemas.

ESPECIE

DESCRIPCIÓN



Congrejo rojo americano
Procambarus clarkii

INVASORA

Rango altitudinal: 240 - 2600 ms.n.m.
Distribución: nativo del noreste de México y el sur de Estados Unidos, se ha introducido en todos los continentes, excepto en la Antártica y en Oceanía.
Ecosistema: bosque andino.
Puede alcanzar hasta 12 centímetros de longitud de cuerpo, sin incluir las pinzas. Presenta un caparazón de coloración variable con tonos verde oliva, marrón y gris. Esta especie presenta buena tolerancia a una amplia gama de condiciones ambientales, una elevada capacidad de adaptación, una alta tasa de crecimiento elevada y una estrategia de alimentación flexible.



Carpa china
Ctenopharyngodon idella

INVASORA

Rango altitudinal: 1200 - 2400 ms.n.m.
Distribución: especie originaria de China y el este de Siberia, introducida en Colombia.
Ecosistema: bosque andino.
Tiene coloración pardo-verde, no tiene bigotes y tiene hocico muy corto. Viven en remansos de los grandes ríos con flujo lento, charcas y lagos subtropicales con abundante vegetación. Esta especie presenta buena tolerancia a una amplia gama de condiciones ambientales y genera perjuicio principalmente a la vegetación sumergida.

ESPECIE

DESCRIPCIÓN



Dividivi
Caesalpinia spinosa

NATIVO

Rango altitudinal: 150 - 2750 ms.n.m.
Endemismo: cosmopolita.
Distribución: Colombia hasta Argentina.
Ecosistema: bosque seco.
Tiene un tamaño de 2 a 5 m de altura, su corteza es de color gris oscuro, con espinas dispersas y ramas peludas; las flores son de color amarillo a naranja y dispuestas en racimo; el fruto es una superficie plana que contiene 4-7 semillas negras y redondas que enrojecen cuando están maduras. Se usa para la recuperación de áreas degradadas y como medicina tradicional.



Raque
Vallea stipularis

NATIVO

Rango altitudinal: 1990 - 4300 ms.n.m.
Endemismo: cosmopolita.
Distribución: Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Categoría de amenaza: LC
Ecosistema: bosque andino.
Árbol que llega a medir hasta 10 m de altura con tallos jóvenes rojizos, flores pequeñas en forma de campana de color rojo carmesí o rosado; el fruto es de color verde limón y se abre de forma espontánea para dispersar las semillas. Favorece la producción de miel por ser apetecido el néctar de sus flores por las abejas.